

核准日期：2007年01月30日  
修改日期：2010年03月23日  
修改日期：2010年12月06日  
修改日期：2014年04月16日  
修改日期：2015年12月01日  
修改日期：2020年10月29日  
修改日期：2021年07月09日  
修改日期：2023年04月13日

# 盐酸昂丹司琼片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

## 【药品名称】

通用名：昂丹司琼

商品名：昂丹司琼片

规格：8mg\*10片/盒


化学名：Ondansetron Hydrochloride

本品主要成份为昂丹司琼。

【性状】

本品主要成份为盐酸昂丹司琼。

本品为白色或类白色片。



放射治疗引起的恶心呕吐；2.预防和治疗手术后的恶心呕吐。

化疗前15分钟、化疗后4小时、8小时各静脉注射昂丹司琼注射液8mg，停止化疗以，连用5天。

吐：化疗前15分钟静脉注射昂丹司琼注射液8mg，以后每8~12小时口服昂丹司琼片

放疗前1~2小时口服片剂8mg（2片），以后每8小时口服8mg（2片），疗程视放疗

前1小时口服片剂8mg（2片），放疗后每8小时口服片剂8mg（2片），连用5天。

失眠、口干、便秘、偶见支气管哮喘或过敏症状、短暂性头痛或头晕加重、上述反应轻微、无须特，并有烦躁、心悸不安、低血压及心动过速等不良反应。

与吗啡联合用药时有严重低血压和意识丧失的报道，故本品禁止与阿片类药物联合使用。

【用法用量】


口服给药。用法见包装说明书。

对于中度或重度恶心呕吐患者每次口服剂量可增加至8mg，且给药间隔可缩短至4小时。因此，用药剂

量不足，以完成给药疗程为目的。

见，并见有不良反应报告。上市前已有接受昂丹司琼治疗的癌症患者发生心律失常的报道，个别病例可进展为尖端扭转型室速，甚至导致猝死。因此，接受昂丹司琼治疗的患者应密切监测心电图，主要指标包括QTc

化学名称：2,3-二氧-5H-吡啶-4-酮  
化学结构式：



分子式：C<sub>16</sub>H<sub>15</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>·HCl·2H<sub>2</sub>O

分子量：365.86

【性状】

本品为白色或类白色片。

【适应症】

止吐药。用于：1.细胞毒性药物化疗和

【规格】

4mg（以C<sub>16</sub>H<sub>15</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>计）

【用法用量】

1.对于高度催吐的化疗药引起的呕吐：

后每8~12小时口服昂丹司琼片8mg（2片）

2.对催吐程度不太强的化疗药引起的呕

8mg（2片），连用5天。

3.对于放射治疗引起的呕吐：首剂须于

的疗程而定。

对于预防手术后的恶心呕吐：在麻醉

【不良反应】

可有失眠、便秘、口干、偶见支气管哮喘或过敏症状、短暂性头痛或头晕加重、上述反应轻微、无须特、个别患者有烦躁不安

【禁忌】

由于昂丹司琼与吗啡可

联合使用，可能导致

【注意事项】

1.对于中度或重度患者，

2.对于轻度患者，

或每日不超过8mg。

3.昂丹司琼片不能与

4.昂丹司琼片可与

5.昂丹司琼片可与

